

||||| FICHA TÉCNICA

Polvo Mojable (WP)
Propineb /700 g/Kg
Fungicida
Contacto - Preventivo
Uso agrícola
Registro Nacional No. 2392
Titular del registro: Bayer S.A



Antracol®

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Propineb /700 g/Kg
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 kilogramo

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Al usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta. Al momento de manipular usar equipo de protección personal. CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

ANTRACOL® WP70 es un fungicida preventivo protectante con amplio espectro; de acción multisitio, afectando la respiración celular del hongo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	¹ P.C.	² P.R.
ARROZ	Complejo Manchado de grano	2.5 Kg/ha	45 días	4 horas
PAPA	Gota Phytophthora infestans	1.5 kg/ha	14 días	
TOMATE	Tizón Alternaria solani	2.0 kg/ha	14 días	
TOMATE DE ÁRBOL				
LULO				
PIMENTÓN				
CEBOLLA	Mildeo vellosa Peronospora destructor	2.0 kg/ha	7 días	
CLAVEL	Mancha Anillada o Anular Cladosporium echinulatum	2.5 kg/ha	N.A.	
CÍTRICOS	Antracnosis Colletotrichum gloesporioides	1.5 kg/ha	7 días	
MELÓN	Pseudoperonospora cubensis	2.0 kg/ha	7 días	
SANDÍA				
UCHUVA	Alternaria sp.	1.8 kg/ha	14 días	
	Mancha gris Cercospora sp.			

N.A.: No aplica

¹P.C. **Periodo de carencia:** tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

²P.R. **Periodo de re-entrada:** tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Arroz: Realizar aplicación de manera preventiva, en máximo en embuchamiento. Volumen de aplicación 200 L de agua/ha.

Papa: Aplicar de manera preventiva. Se recomienda aplicar en volúmenes de agua mínimos de 200 L/ha, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, buscando cubrir todo el follaje.

Tomate: Realizar aspersión foliar de manera preventiva; cuando el follaje no presenta síntomas de la enfermedad.

Cebolla: Aplicar de manera preventiva. Se recomienda aplicar con volumen de agua de 400 L/ha, que garanticen una buena cobertura del cultivo.

Clavel: Realizar dos aplicaciones de manera preventiva. **1° Aplicación:** Preventiva, **2° Aplicación:** 7 a 10 días después de la primera aplicación. La dosis dependerá de la presión de la enfermedad en cada zona, al igual de la sensibilidad de la variedad sembrada. Volumen de aplicación 1000 L de agua/ha.

Cítricos: Aplicar de manera preventiva o máximo con los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de agua mínimo de 400 L/ha.

Melón: Se recomienda aplicar con un volumen de agua suficiente, que permita una buena cobertura del cultivo.

Uchuva: Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda la aplicación de ANTRACOL® WP70 con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. Debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas - FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar. ANTRACOL® WP70 en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomiendan pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES
DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- **EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.**
 - Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y mezclar el producto: guantes, pantalón largo, camisa de manga larga, calzado resistente, delantal de caucho y protección facial. para aplicar e ingresar al área tratada: guantes, pantalón largo, camisa de manga larga, calzado resistente y protección facial.
- **Utilice protección respiratoria (respirador ó mascar) cuando manipule ó use el producto en invernaderos.**
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- No permita animales en el área tratada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto. No re-utilice el nevaso para ningún otro propósito.**
 - No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- **Transportelo solamente con productos agroquímicos, separado de productos de consumo humano y animal.**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (cal agrícola o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y desechar acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (aplicación terrestre) y 100 metros (aplicación aérea).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso

*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience

Línea 018000111212

Bogotá, D.C, Colombia

®Marca Registrada

