

Gránulos dispersables en agua WG

Fungicida

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 0269

Actualización: 09 de octubre de 2018

F

Cabrio® Top WG

CABRIO TOP® WG es un fungicida con base en pyraclostrobin y metiram que controla un amplio espectro de hongos. Pyraclostrobin es una estrobilurina sistémica translaminar que inhibe la respiración mitocondrial interrumpiendo el transporte de electrones.

Metiram es un fungicida perteneciente al grupo de los EBDC's (ditiocarbamatos) que actúa por contacto, interrumpe procesos bioquímicos (respiración, biosíntesis, y transporte de energía) inhibiendo la actividad enzimática.

Por su composición y naturaleza CABRIO TOP® WG posee una excelente actividad preventiva y curativa temprana sobre hongos deuteromicetos, basidiomicetos, ascomicetos y oomicetos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Metiram 550 g/Kg zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) -poly(ethylenethiuram disulfide).

Pyraclostrobin 50 g/Kg methyl N-(2-{{1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl}oxymethyl}phenyl)-N-methoxy carbamate.

Ingredientes aditivos:

C.s.p. 1 Kg

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Gránulos dispersables en agua WG

Fungicida

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 0269

Actualización: 09 de octubre de 2018

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	Enfermedad	Dosis Kg/Ha	PR*	PC**
Cebolla de bulbo (<i>Allium cepa</i> L.) Cebolla de rama (<i>Allium fistulosum</i> L.)	Mancha púrpura, punteo (<i>Alternaria porri</i>)	2.5	Para todos los cultivos: Al secarse el follaje	Para todos los cultivos: 7 días después de la última aplicación
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	2.5		
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.5		
Ornamentales (Rosa)	Botritis (<i>Botrytis</i> sp)	1.6 - 2.4 g/L (1000 L de agua /Ha.)		
Cítricos <i>Citrus</i> spp (Mandarina)	Mancha alternaria (<i>Alternaria citri</i>)	2.0		
Papaya (<i>Carica papaya</i>)	Variola (<i>Asperisporium caricae</i>)	1.5 (0.5 Kg/caneca 200 L)		
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mildeo polvoso (<i>Erysiphe cichoracearum</i> y <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	1.5		
Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	Mancha ascochyta (<i>Ascochyta pisi</i>)	2.0		

PR*: Periodo de reentrada, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la entrada de personal al área tratada.

PC**: Periodo de carencia, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

CABRIO TOP® WG se debe aplicar de manera preventiva cada 7 a 10 días en tomate-cebolla y cada 12 a 15 días en frijol, o al observar los primeros síntomas de la enfermedad cuando las condiciones del ambiente sean favorables para su desarrollo.





COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

CABRIO TOP® WG es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso común excepto con los de reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad antes de mezclar con otros productos.

PRESENTACIÓN: 500 g, 800 g, 1.0 Kg.

PRECAUCIONES:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. Evite contacto con la piel y la ropa. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.

Por ingestión: Lavar la boca y administrar un vaso de agua potable. NO INDUZCA EL VOMITO, si la persona esta inconsciente o convulsionando. Solamente bajo recomendación médica.

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para éste fin. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo.