

**1. Composición:**

PARAQUAT..... 200 g/L

1,1' – dimethyl- 4,4' - bipyridinediium, de formulación a 20°C.

**2. Características del producto:**

Familia química: Biperidilo

Clasificación toxicológica (OMS): II Ligeramente Peligroso

Usos: Herbicida

Código HRAC: Grupo D

**3. Modo y mecanismo de acción:**

Es un herbicida que actúa por contacto en las partes verdes de las plantas. Controla malezas de hojas anchas y gramíneas. **NO ES SELECTIVO A NINGUN CULTIVO O ESPECIE VEGETAL.** Se inactiva al entrar en contacto con las partículas del suelo. Se puede utilizar para efectuar quema de malezas en presiembra y pre-emergencia en arroz.

**4. Equipo de aplicación:**

Se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre.

**5. Forma de preparación de la mezcla:**

El producto formulado puede causar corrosión leve al contacto con el hierro y el aluminio. Pueden utilizarse equipos de calibración terrestre. En aplicaciones terrestres utilizar caudales de 200 litros por hectárea con una velocidad de marcha de 8-10 km/hora. Las aplicaciones de DUNKA® 20 SL, deben ser exclusivamente terrestres.

**6. Recomendaciones de uso:**

Cultivos autorizados para Colombia:

Cultivo	Maleza	Dosis
Arroz ( <i>Oryza Sativa</i> )	Amor seco ( <i>Bidens pilosa</i> ), Arroz rojo ( <i>Oriza sativa</i> ), Batatillas ( <i>Ipomoea congesta</i> ), Botoncillo ( <i>Eclipta alba</i> ), Cortadera ( <i>Cyperus esculentus</i> ), Dormidera ( <i>Mimosa púdica</i> ), Diente de Leon ( <i>Taraxacum officinale</i> ), Escoba ( <i>Sida acuta Burn</i> ), Guardarocio ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ), Hierba de chivo ( <i>Ageratum conyzoides</i> ), Lengua de Vaca ( <i>Rumex conglomerata</i> ), Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> ), Pega pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ), Trebol rojo ( <i>Trifolium pratense</i> ), Trebol blanco ( <i>Trifolium repens</i> ), Uchuva ( <i>Physalis angulata</i> ), Yerba de sapo ( <i>Euphorbia hirta</i> ), Pasto guinea ( <i>Panicum máximum</i> ), Pasto kikuyo ( <i>Pennisetum clandestinum</i> ), Raygrass ( <i>Lolium multiflorum</i> ), Helecho ( <i>Pteridium aquilinum</i> ).	1.5 a 3.0 L/ha
Papa		1.5 a 3.0 L/ha

### 7. Intervalo de aplicación:

Se recomienda hacer una sola aplicación antes de que germine el arroz cuando las malezas tengan menos de 25 cm de altura. Utilizar la dosis baja para malezas de dos a tres hojas verdaderas y la dosis alta para malezas de 25 cm de altura.

### 8. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

No aplica.

### 9. Intervalo de reingreso al área tratada:

Arroz 12 horas  
Papa N.A

### 10. Fitotoxicidad:

Las aplicaciones aéreas no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas u otros cultivos.

### 11. Compatibilidad:

Aún cuando DUNKA® 20 SL es compatible con otros productos formulados, se recomienda hacer una prueba física. DUNKA® 20 SL no tiene efecto alguno sobre cultivos sucesivos.

### 12. Registro de Venta ICA:

Registro Nacional ICA 898