

||||| FICHA TÉCNICA

Polvo Mojable (WP)
Cymoxanil + propineb / 60+700 g/kg
Fungicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 2338



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Cymoxanil + propineb / 60+700 g/kg

Ingredientes aditivos:

c.s.p. 1 kilogramo

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Al usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta. Al momento de manipular usar equipo de protección personal.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

FITORAZ® WP 76 es un fungicida protectante y curativo, que tiene actividad de contacto y sistemica local e inhibe la esporulación, se recomienda su uso dentro de un manejo integrado del cultivo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	¹ P.C.	² P.R.
PAPA	Gota o Tizón <i>Phytophthora infestans</i>	1.5 kg/ha	14 días	4 horas
TOMATE LULO TOMATE DE ÁRBOL	Gota o Tizón <i>Phytophthora infestans</i>	2.0 kg/ha		
ARVEJA	Mildeo <i>Peronospora pisi</i>	2.0 kg /ha		

¹P.C: Periodo de Carencia: Días entre la última aplicación y la cosecha.

²P.R: Periodo de re-entrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez finalizado el mismo podrán reingresar utilizando elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado; para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes confinados (invernaderos) respirador o máscara.



Papa: Aplicar de manera preventiva o máximo con el inicio de los primeros síntomas de la enfermedad, utilizando un volumen de 600 L de agua/ha.

Tomate: Se recomienda aspersión foliar de manera preventiva o al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. Es importante garantizar una buena cobertura del cultivo para obtener los mejores resultados.

Arveja: Realizar la aplicación foliar, de manera preventiva o máximo con los primeros síntomas visibles de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

FITORAZ® WP 76 debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas - FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de efectuar mezclas, debe realizar previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fito-compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FITORAZ® WP 76 en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomiendan pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- **CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS**
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y mezclar el producto: guantes, pantalón largo, camisa de manga larga, calzado resistente, delantal de caucho y protección facial; para aplicar e ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada: guantes, pantalón largo, camisa de manga larga, calzado resistente y protección facial.
- Utilice protección respiratoria (respirador ó mascarara) cuando manipule ó use el producto en invernaderos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No permita animales en el área tratada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto. No re-utilice el envase para ningún otro propósito.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, separado de productos de consumo humano y animal.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría tóxica: III - Ligeramente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

