Infinito®

Fungicida / Suspensión concentrada

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Ingrediente activo:
Fluopicolide + Propamocarb clorhidrato

Composición porcentual:

Ingrediente activo:	**% en peso**
Fluopicolide: 2,6-Dicloro-N-[[3-cloro-5-(trifluoro-metil)-2-pyridinil]methil]benzamida	5.55
(Equivalente a 62.5 g de i.a./L a 20°C)	
Propamocarb clorhidrato: Propil 3-(dimetilamino)propilcarbamato-hidrocloruro	55.55
(Equivalente a 625 g de i.a./L a 20°C)	
Ingredientes inertes: espesante, emulsificante, dispersante, antiespumante, disolvente, impurezas y compuestos relacionados	38.90
TOTAL	**100.00**

Categoría toxicológica:
4 Precaución

No. de Registro:
RSCO-MEZC-1301S-301-064-061

USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía Chayote (2)	Mildiú de las cucurbitáceas	*Pseudoperonospora cubensis*	1.25 – 1.75	Iniciar aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad, repetir en caso necesario a intervalos de 7 días, realizar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Chile Jitomate Tomate de cáscara Berenjena Papa (5)	Tizón Tardío	*Phytophthora infestans*	1.5 – 2.0	Realizar cuatro aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
Tomate Tomate de cáscara Chile Chile habanero Pimiento Berenjena (5)	Tizón Tardío	*Phytophthora infestans*	3.0 a 3.5 ml/L de agua	**Para condiciones de agricultura protegida:** Realizar 3 aplicaciones en forma terrestre a intervalo de 7 días.

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar con su exportador o importador antes de aplicarlo.

Pepino Calabacita Chayote (2)	Mildiú de las cucurbitáceas	*Pseudoperonospora cubensis*	2.5 a 3.0 ml/L de agua	**Para condiciones de agricultura protegida:** Realizar una aplicación al follaje, de ser necesario realizar dos aplicaciones adicionales a intervalo de 7 días.
Cebolla Espárrago Poro Ajo (7) Cebollín (4)	Mildiú	*Peronospora destructor*	1.5 – 2.0	Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua de 150 – 250 L. Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días.
Rosal (SL)	Mildiú	*Peronospora sp.*	1.25 – 1.75	Realizar la aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad, hacer 3 aplicaciones a intervalo de 7 días en un volumen de 250 a 350 L.

El tiempo de reentrada a las zonas tratadas es de 12 horas.
( ) I. de S. : días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L

Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, garantiza que el contenido de ingredientes activos y contenido neto del producto corresponden a lo indicado en la etiqueta del producto. Como el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, Bayer de México, S.A. de C.V., División Crop Science, no se hace responsable del uso y resultados del producto. Los límites máximos de residuos (LMR) y tolerancias de importación para cultivos o subproductos procesados resultantes de la aplicación de este producto pueden no estar establecidos internacionalmente o pueden diferir, en otros países, de los valores establecidos en México. Para cultivos de exportación, verificar esa información antes de utilizar este producto. En caso de dudas, consultar con su exportador o importador antes de aplicarlo.