



FICHA TÉCNICA  
**KOYOTE**  
EC

**KOYOTE®**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**  
**REGISTRO ICA No. PL0010692023**  
**A NOMBRE DE SODIAK S.A.**



**INGREDIENTES ACTIVOS:**  
Lambdacialotrina 50 g/L

**GRUPO QUÍMICOS:**  
Piretroides

**MECANISMO DE ACCIÓN:**  
Lambdacialotrina afecta los puentes de sodio de las células nerviosas, generando la parálisis de los organismos patógenos.

**MODO DE ACCIÓN:**  
Insecticida de rápida acción por contacto e ingestión.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Litros PC/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
ALGODÓN	<b>Gusano bellotero</b> ( <i>Heliothis virescens</i> )	<b>0.5 - 0.85</b>	Aplicar cuando haya entre 15 - 20% de larvas en terminales o el mismo porcentaje de daño fresco en botones florales.
	<b>Picudo</b> ( <i>Anthonomus grandis</i> )	<b>0.5</b>	En aplicaciones aéreas utilizar 35 litros de mezcla por hectárea, en aspersiones terrestres utilizar 300 - 400 litros de mezcla por hectárea.
ARROZ bajo riego	<b>Gusano cogollero</b> ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	<b>0.5</b>	Aplicar cuando se presentan niveles de hasta 10 larvas/metro cuadrado.
	<b>Marranita</b> ( <i>Neocultilla hexadactyla</i> )	<b>0.35</b>	Aplicar 10 días después de la germinación con 5% de plantas trozadas.
ROSAS CLAVEL	<b>Arañita roja</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0.5 L/Ha (o 0.5 cm <sup>3</sup> /L de agua, para un volumen de 1000 Litros de agua/Ha)	Aplicar en un programa de rotación con productos de diferente modo de acción.
PAPA	<b>Pulguilla</b> ( <i>Epitrix spp</i> )	<b>0.5 L/Ha</b>	Aplicar durante los primeros estados de desarrollo del cultivo, cuando se encuentre un promedio de 2 o más adultos/planta y/o 10% de área foliar afectada.
	<b>Minador de la hoja</b> ( <i>Lyriomiza quadrata</i> )	0.2 - 0.4 L/Ha (o 0.5 - 1.0 cm <sup>3</sup> /L de agua, para un volumen de 400 Litros de agua/Ha)	Aplicar al aparecer los síntomas de daño en las plantas observadas. Repetir la aplicación con base en monitoreo de cultivo y plaga.
SORGO	<b>Gusano cogollero</b> ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	<b>0.6</b>	Aplicación por vía terrestre.
CEBOLLA	<b>Trips</b> ( <i>Thrips tabaci</i> )	0.2 - 0.4 L/Ha (o 0.5 - 1.0 cm <sup>3</sup> /L de agua, para un volumen de 400 Litros de agua/Ha)	Aplicar con un nivel mayor a 2 insectos/planta. Repetir con base en monitoreo del cultivo y la plaga.
PASTOS	<b>Chinche de los pastos</b> ( <i>Collaria columbiensis</i> )	<b>0.5 - 0.75 L/Ha</b>	Aplicar una sola vez durante el ciclo de recuperación de la pradera (20 días después del último pastoreo).



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II**  
**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

